

# Le Pécari à collier

Le Pécari à collier

*Pecari tajacu*

1.

*Pecari tajacu angulatus*

, Pécari à collier du Texas

2.

*Pecari tajacu bangsi*

(Panama)

3.

*Pecari tajacu crassus*

(Mexique)

4.

*Pecari tajacu crusnigrum*

(Panama)

5.

*Pecari tajacu humeralis*

(Mexique)

6.

*Pecari tajacu macrocephalus*

(Guyana)

7.

*Pecari tajacu modestus*

(Colombie)

8.

*Pecari tajacu nanus*

(Mexique)

9.

*Pecari tajacu nelsoni*

(Mexique)

10.

*Pecari tajacu niger*

(Equateur)

11.

*Pecari tajacu nigrescens*

(Honduras)

12.

*Pecari tajacu patira*

(Guyane française, Vénézuéla)

13.

*Pecari tajacu sonoriensis*

(Mexique)

14.

*Pecari tajacu tayacu*

(Brésil, Uruguay)

15.

*Pecari tajacu torvus*

(Colombie)

16.

*Pecari tajacu yucatanensis*

(Mexique)

## Description

**Longueur du corps**  
: 80-105 cm



**Durée de gestation**  
: 141-151 jours  
**Taille de la portée**  
: 1-5  
**Sevrage**

: 2-3 mois

**Maturité sexuelle**

: femelles à 8-14 mois, mâles à 11 mois

**Durée de vie**

: jusqu'à 24 ans



Les pécaris se reproduisent vers le mois de mai. les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 11 mois, les femelles vers 8 à 14 mois. Le mâle dominant est le seul animal à se reproduire. les autres mâles ne sont pas autorisés à approcher les femelles en chaleur mais peuvent rester à l'intérieur de la troupe. Les femelles ont environ 2 à 4 petits par portée.

## Ecologie et comportement

### Distribution géographique



Nord de l'Argentine; du nord ouest du Pérou jusqu'au Texas, sud ouest du Nouveau Mexique et Arizona (Etats-Unis). introduit à Cuba.

Aire de distribution (d'après Bodmer and SOWLS, 1993)



## Statut

CITES - l'espèce  
*Tayassu*  
est inscrite en Annexe II.

Les principaux prédateurs du pécaris sont l'homme, le coyote, le puma, le jaguar et le lynx.

Même si les pécaris à collier savent s'adapter à leur milieu, certaines sous-espèces sont actuellement menacées par la destruction des forêts tropicales.





Yes