

Porc local en Afrique intertropicale

Porc local en Afrique intertropicale

Informations générales

Autres dénominations

: Porc local, Somo (au Mali), Bakosi (Gabon) - West African Dwarf pig (Nigeria) - Ashanti (Ghana) Dwarf pig, Bush pig (Togo) - (porc local)

Répartition géographique Effectifs



L'effectif est de 324 000 têtes en Côte-d'Ivoire, env. 500 000 au Bénin et 450 000 en RCA. En Ethiopie, il n'y a pas de porc local, mais des porcs noirs ont été importés d'Italie. Un porc indigène noir ou taché est signalé en Ouganda. Il pourrait descendre d'importations anciennes (Mason et Maule, 1960).

L'effectif des porcins était estimé à 19 millions de têtes en Afrique en 1992 et à 864 millions dans le monde par la FAO. Plus de 50 % de ces porcs africains sont dans les pays côtiers de l'Atlantique de la Guinée-Bissau au Gabon (Dorgeval, 1996).

Système d'élevage

L'élevage du porc est peu important et en relation directe avec la religion de la population. Les musulmans ne consommant pas cet animal n'en élèvent pas.

Le système d'élevage est de type sédentaire extensif et traditionnel. Le plus souvent, c'est un élevage villageois. Il peut être libre, avec divagation, avec ou sans complémentation ou sous claustration avec complémentation (restes de cuisine, sons de maïs, de blé, de sorgho, de mil, fanes d'arachides, tourteaux de palmiste ou de coco). Ce porc tolère des irrégularités alimentaires et résiste bien à la chaleur. Il est prolifique.

Au Sénégal, on distingue 3 types d'éleveurs : naisseur, naisseur-engraisseur et engraisseur. Au Bénin, la viande de porcs locaux est plus appréciée que celle des races importées. Les performances sont très hétérogènes. La sélection en race pure est possible.

Description

Le porc africain est issu surtout de la race ibérique et il est à peu près le même dans tous les pays africains où il existe, de type coureur et longiligne.

Le format est petit. La tête, longue, présente un front court, presque plat un chanfrein rectiligne et un groin allongé. Les oreilles sont petites, épaisses et horizontales ou dressées. Le cou est court, le dos légèrement convexe et assez long. La croupe est inclinée, le jambon peu fourni. Les membres sont grêles, peu musclés. Les tétines sont souvent au nombre de 10. Les soies sont longues.

La robe est souvent noire. Elle peut être pie noire, grise, rousse. Au Congo, la robe est brune, noire, blanche ou tachée (Mason et Maule, 1960). En Côte d'Ivoire, elle est noire ou tachetée.

Qualifications

Utilisations principales

: Viande (40 kg à l'abattage)

Autres aptitudes

: fumier

Performances

Mensurations, poids, viande

Caractères	Femelles	Mâles
Statut au grand (cm)	40-45	
Perimètre thorac. (cm)		
Long. corps (cm)		
Poids carcasse (kg)	1.8 (17) / 1.1 (12)	
Poids au sautoir (kg)		
Age au sautoir (mois)		
Poids à 1 an (kg)	50-60 (12)	
Poids à 2 ans (kg)		
Poids adulte (kg)	20 (15) / 10 (7)	30 (18) / 15 (10)
Reprod. viable	11 (19-25)	

Performances des femelles (élevage traditionnel)

BF = Burkina Faso C = Cameroun CI = Côte d'Ivoire

Statut au grand (cm)	40-45
Perimètre thorac. (cm)	
Long. corps (cm)	
Poids carcasse (kg)	1.8 (17) / 1.1 (12)
Poids au sautoir (kg)	
Age au sautoir (mois)	
Poids à 1 an (kg)	50-60 (12)
Poids à 2 ans (kg)	
Poids adulte (kg)	20 (15) / 10 (7)
Reprod. viable	11 (19-25)



Yes