

L'Hylochère

L'Hylochère

Hylochoerus meinertzhageni

1.

Hylochoerus meinertzhageni ituriensis

(Congo)

2.

Hylochoerus meinertzhageni ivoriensis

(Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Sierra Leone)

3.

Hylochoerus meinertzhageni meinertzhageni

(RDC, Rép. Centrafricaine, Kenya, Ethiopie, Tanzanie)

4.

Hylochoerus meinertzhageni rimator

(du Cameroun à l'est du Nigeria, Congo et RDC)

Description

Reproduction

Les naissances s'étalent de janvier à août, avant la saison des pluies. Avant la mise-bas, les femelles quittent le groupe et construisent un nid pour leurs nouveaux nés. Une semaine seulement après la naissance, la femelle rejoint son groupe accompagnée de sa portée. Les jeunes peuvent ainsi être élevés et protégés par l'ensemble de la troupe.

Ecologie et comportement

L'hylochère est une créature craintive et peu facile à observer. Les données sur son comportement en milieu sauvage restent rares. On note toutefois qu'ils sont de moeurs nocturnes et vivent en groupe de 6 à 14 individus sous la dominance d'un mâle. Les jeunes mâles forment des groupes satellites de célibataires. Ces animaux peuvent parcourir un territoire de 8 à 12 km par jour.

Distribution géographique

De la Guinée au Ghana; de l'est du Nigeria jusqu'au Kenya et au nord de la Tanzanie; sud-ouest de l'Ethiopie.

Aire de distribution (d'après d'Huart, 1993)

Statut



L'hylochère doit faire face à une chasse importante et à une réduction continue de son habitat. Cependant la taille de la population ne semblent pas diminuer. La sous-espèce *Hylochoerus meinertzhageni ivoriensis* est inscrite par l'IUCN comme espèce vulnérable.



Yes