

L'Hippopotame nain

L'Hippopotame nain
Hexaprotodon liberiensis

Description

Leur peau lisse et chauve va du noir-brun jusqu'au au pourpre, avec les joues souvent teinté de rose. Une sécrétion muqueuses leur permet de garder une peau humide et brillante. Le corps est gonflé et est soutenu par des membres relativement longs. La tête est ronde et plus étroite que l'hippopotame commun, avec des yeux placés plus latéralement.

Reproduction



La mise-bas a lieu à terre ou en eau peu profonde. Il tête ensuite 2 à 3 fois par 24 heures et reste caché pendant plus de 3 semaines.

Ecologie et comportement

Les hippopotames nains possèdent de nombreux aires de repos dans tout leur territoire, qu'ils utilisent exclusivement pour dormir. Les deux sexes disposent d'un large territoire, couvrant 100-150 acres pour les femelles et environ 400 acres pour les mâles. Ils évitent de rencontrer leurs congénères et s'enfuit rapidement à l'approche d'un danger.

Distribution géographique

Dans les rivières et marais en forêt dense d'Afrique de l'ouest (Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, et probablement Nigeria et Guinée).

Statut



L'hippopotame nain est classé vulnérable par l'IUCN; la sous-espèce *H. l. heslopi* est quant à elle fortement menacée.



Classe:
Mammalia

Ordre:
Artiodactyla

Famille:
Hippopotamidae

Yes