

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng lợn con

(Dùng chung cho chăn nuôi lợn con của nái Móng Cái và nái F1)

I. Nuôi dưỡng và chăm sóc lợn sơ sinh

- Đảm bảo đủ ấm cho lợn con lúc mới sinh, nhất là vào thời điểm nhiệt độ không khí thấp.
- Trong tuần đầu, nhiệt độ chuồng úm cần ở mức 32 - 34°C. Do đó chỉ quét dọn khô, thay lót bẩn. Nên để gói vôi bột ở góc chuồng để hút ẩm.
- Cho lợn con nằm chỗ cao ráo, có lót lá chuối khô hoặc cỏ khô, rơm khô.
- Cho lợn con bú sữa đầu ngay sau khi sinh nửa giờ
- Tránh ồn ào để khỏi ảnh hưởng đến lợn con và sự tiết sữa của lợn mẹ.
- Bổ sung sắt cho lợn con đợt 1 từ 2 - 4 ngày tuổi (tiêm 1ml Dextran Fe/con) để chống thiếu máu.




II. Nuôi và chăm sóc lợn con từ 8 - 20 ngày tuổi

- Lượng sữa của lợn mẹ tăng dần từ ngày đẻ, đạt mức cao nhất vào ngày 21 - 24, sau đó giảm dần. Do đó phải tập cho lợn con ăn sớm để lợn con tăng trưởng tốt, đồng thời giúp cho lợn mẹ bớt bị hao mòn cơ thể, ảnh hưởng đến kỳ sinh sản sau.
- Nên cho lợn con tập ăn sớm bằng thức ăn đủ dinh dưỡng, dễ tiêu.
- Thức ăn cho vào máng tập ăn, để trong khoang chuồng lợn con để lợn mẹ khỏi ăn, ngày cho ăn 3- 4 lần. Ăn xong rửa máng phơi khô để tránh ẩm ướt làm lên men thức ăn gây rối loạn tiêu hoá dẫn đến ỉa chảy hoặc ỉa phân trắng.
- Nên tiêm Dextran Fe lần 2 cho lợn con từ 7 - 10 ngày tuổi (liều lượng 1 - 2 ml/con).
- Thiến lợn đực nuôi thịt lúc 12 - 14 ngày tuổi

III. Nuôi và chăm sóc lợn con từ 21 ngày tuổi đến cai sữa

- Từ 20 - 30 ngày tuổi : mỗi ngày cho ăn từ 150 - 250 g/con (cháo hoặc thức ăn hỗn hợp).
- Từ 30 - 45 ngày tuổi : từ 250 - 350 g/con.
Có thể bổ sung thức ăn đậm đặc giàu đạm hoặc thức ăn hỗn hợp (dùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất).
- Tiêm vaccin Phó thương hàn 2 - 3 ml/con vào ngày thứ 23.
- Chọn lọc lần đầu để gây hậu bị cái, hậu bị đực.
- Tăng dần thức ăn tập ăn. Bắt đầu tách lợn con khỏi lợn mẹ 1/2 giờ 1 lần, một ngày 2 - 3 lần. Số lần tách có thể tăng dần theo ngày tuổi của lợn (cứ 4 - 5 ngày tăng thêm 1 lần).
- Nên cai sữa cho lợn con giống nội ở 45 ngày tuổi, giống ngoại lai cai sữa vào thời điểm 28 - 30 ngày tuổi (nếu đủ điều kiện). Không cai sữa cho lợn dưới 5 kg.
- Khi bắt đầu cai sữa, cho lợn mẹ lẫn lợn con nhịn đói 24 giờ nhưng vẫn đảm bảo đủ nước uống.
- Tiêm vaccin phòng dịch tả cho lợn con lúc đạt 30 - 35 ngày và tách lợn mẹ hoặc lợn con ra ở riêng.



IV. Nuôi và chăm sóc lợn con sau cai sữa đến xuất chuồng

- Sau cai sữa nếu nuôi chuyển tiếp không tốt thì đàn lợn sẽ bị ỉa chảy, còi cọc và chậm lớn.
- 10 ngày đầu sau cai sữa cho lợn con ăn tăng dần để tăng trọng tốt và tránh được bệnh ỉa chảy.