

Le Sanglier de brousse ou Potamochère

Le Sanglier de brousse ou Potamochère
Potamochoerus larvatus

1.
Potamochoerus larvatus daemonis
2.
Potamochoerus larvatus hassama
(Afrique de l'est: Ethiopie, sud Soudan, est RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya et nord Tanzanie)
3.
Potamochoerus larvatus hova
, Potamochère de l'Est de Madagascar (Madagascar)
4.
Potamochoerus larvatus johnstoni
(Congo)
5.
Potamochoerus larvatus koiropotamus
(Angola, Afrique du sud-est)
6.
Potamochoerus larvatus larvatus
(Mayotte, Comores, ouest Madagascar)
7.
Potamochoerus larvatus nyasae
8.
Potamochoerus larvatus somaliensis
(Somalie)

Description

Longueur du corps
: 100-150 cm

Hauteur au garrot
: 55-80 cm

Longueur de la queue
: 30-43 cm

Poids
: 54-115 kg

Reproduction

Durée de gestation

: 120-127 jours

Taille de la portée

: 1-4, jusqu'à 6

Sevrage

: 2-4 mois

Maturité sexuelle

: 18-21 mois

Durée de vie

: jusqu'à 20 ans

La plupart des naissances ont lieu au printemps (septembre-novembre) avant le début de la saison des pluies.

Ecologie et comportement

Distribution géographique

Ethiopie, Sud Soudan, Est RDC, Afrique du Sud, Botswana, Angola; Madagascar et îles des Comores (introduction)

Aire de distribution (d'après Vercammen et al., 1993)



Statut

Espèce non menacée



Oui