

Le Pécari à collier

Le Pécari à collier

Pecari tajacu

1.

Pecari tajacu angulatus

, Pécari à collier du Texas

2.

Pecari tajacu bangsi

(Panama)

3.

Pecari tajacu crassus

(Mexique)

4.

Pecari tajacu crusnigrum

(Panama)

5.

Pecari tajacu humeralis

(Mexique)

6.

Pecari tajacu macrocephalus

(Guyana)

7.

Pecari tajacu modestus

(Colombie)

8.

Pecari tajacu nanus

(Mexique)

9.

Pecari tajacu nelsoni

(Mexique)

10.

Pecari tajacu niger

(Equateur)

11.

Pecari tajacu nigrescens

(Honduras)

12.

Pecari tajacu patira

(Guyane française, Vénézuéla)

13.

Pecari tajacu sonoriensis

(Mexique)

14.

Pecari tajacu tayacu

(Brésil, Uruguay)

15.

Pecari tajacu torvus

(Colombie)

16.

Pecari tajacu yucatanensis

(Mexique)

Description

Longueur du corps
: 80-105 cm



Durée de gestation
: 141-151 jours
Taille de la portée
: 1-5
Sevrage

: 2-3 mois

Maturité sexuelle

: femelles à 8-14 mois, mâles à 11 mois

Durée de vie

: jusqu'à 24 ans



Les pécaris se reproduisent vers le mois de mai. les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 11 mois, les femelles vers 8 à 14 mois. Le mâle dominant est le seul animal à se reproduire. les autres mâles ne sont pas autorisés à approcher les femelles en chaleur mais peuvent rester à l'intérieur de la troupe. Les femelles ont environ 2 à 4 petits par portée.

Ecologie et comportement

Distribution géographique

Statut



Si