Le Sanglier d'Europe

Le Sanglier d'Europe
Sus scrofa

1.
Sus scrofa affinis
(Inde et Sri Lanka)
2.
Sus scrofa algira
(Tunisie, Algérie, Maroc)
3.
Sus scrofa andamanensis
(Ile d'Andaman en Inde)
4.
Sus scrofa attila
(Hongrie, Ukraine, Central Biélorussie, Caucase, Iraq)
5.
Sus scrofa baeticus
(Baléares, sud de l'Espagne et probablement nord Maroc)
6.
Sus scrofa barbarus
(Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Maroc)
7.
Sus scrofa castilianus
(Nord de l'Espagne)
8.
Sus scrofa chirodontus
(Chine)
9.
Sus scrofa coreanus
(Corée)
10.
Sus scrofa cristatus
(région Sud Himalaya: Nepal, nord Birmanie, Inde, Thailande)
11.
Sus scrofa davidi
(région Sud Himalaya: Iran, Pakistan, nord-ouest Inde, Birmanie)
12.
Sus scrofa falzfeini
(Pologne)
13.
Sus scrofa ferus
(Europe du Nord)
14.
Sus scrofa floresianus
(île de Flores en Indonesie)
15.
Sus scrofa jubatus
(Malaisie)
16.
Sus scrofa leucomystax
(Chine)
17.
Sus scrofa libycus
(Trans-caucase, Turquie, Palestine, Yougoslavie, Uzbekistan et Kazakhstan)
18.
Sus scrofa majori

(Italie centrale).
19.
Sus scrofa mandchuricus
(Chine)
20.
Sus scrofa mediterraneus
(Espagne)
21.
Sus scrofa meridionalis
(Andalousie; Sardaigne et Corse)
22.
Sus scrofa moupinensis
(zone costale de la Chine du sud au Vietnam)
23.
Sus scrofa nicobaricus
(île de Nicobar en Inde)
24.
Sus scrofa nigripes
(Asie centrale, Mer caspienne, Afghanistan, Mongolie, Chine, Est Russie)
25.
Sus scrofa papuensis
(Nouvelle Guinée)
26.
Sus scrofa raddeanus
(Mongolie)
27.
Sus scrofa reiseri
(Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Grèce)
28.
Sus scrofa riukiuanus
(Ryukyu Islands - Japon)
29.
Sus scrofa sardous
(Sardaigne, Corse)
30.
Sus scrofa scrofa
(Nord Espagne, Nord Italie, France, Allemangne, Benelux, Danemark, Pologne, Rép.Tchèque, Slovaquie, Albanie)



32.
Sus scrofa sibiricus
(Tunkinsk Mts, Sayan Mts, Sibera, Mongolia, Transbaikalia
33.
Sus scrofa sukvianus
(Chine)
34. Sus scrofa taivanus, Sanglier de Taiwan (Taiwan)
35.
Sus scrofa ussuricus
, Sanglier de Mandchourie (Russie orientale, Mandchourie, Corée, Chine du Nord)
36.
Sus scrofa vittatus
, Sanglier d'Asie (Malaisie: Péninsule, îles de Terutua et Langkawi; Indonésie: Sumatra, Archipèle de Riau, Java et île de Peucang, Bali, Lombok, Sumbawa et Komodo)

Description

Reproduction

Durée de gestation
: 112-130 jours



Il n'y a pas de saisonnalité des naissances sous les tropiques. Dans les régions tempérées, les marcassins naissent avant le printemps. La femelle s'isole et arrange un nid de végétation. Les jeunes deviennent indépendants à l'âge de 7 mois.

Ecologie et comportement

Distribution géographique

Statut



Références

Sí